

## 諾羅病毒腹瀉群聚相關機構與族群防治重點(2015-02-25)

**\* 注意:酒精對諾羅病毒無效，請勿使用酒精消毒環境或乾洗手。**

衛生署疾病管制署  
衛生署食品藥物管理署

機構與族群	防治重點
托嬰中心及幼兒園	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加強托嬰中心及幼兒園食品安全管理，派員監督中央餐廚供應食材來源、環境衛生與食品調理過程應符合衛生條件，發病廚工暫時停止從事餐飲工作，至症狀解除至少 48 小時後方可恢復上班。</li><li>2. 加強衛生教育宣導，包括不生食、不生飲及勤洗手等良好個人衛生習慣。</li><li>3. <b>托嬰中心及幼兒園發生疑似腹瀉群聚事件</b>，請即通報當地衛生機關，並配合進行檢體採檢及疫情調查等相關防疫措施。</li><li>4. 病患嘔吐物及排泄物污染環境應以稀釋漂白水消毒處理。</li></ol>

※諾羅病毒感染個案嘔吐物及排泄物污染場所之消毒方式：

### 一、污染環境消毒方法：

清理者請戴上口罩及手套，用已稀釋成 0.5%(5,000ppm)之漂白水，小心輕灑在嘔吐物或排泄物上，儘速以拋棄式紙巾、抹布或舊報紙覆蓋吸收污染物後清除，然後使用 0.1-0.5%(1,000ppm-5,000ppm)之漂白水，由外往內擦拭污染區域，之後再使用 0.1-0.5%之漂白水大範圍輕灑，作用 30 分鐘後再使用清水擦拭即可。

### 二、漂白水稀釋方法：

#### (一) 準備物品：

1. 市售漂白水：大部份含次氯酸鈉濃度約為 5%。
2. 免洗湯匙 (1 湯匙約為 20cc)。
3. 量杯或寶特瓶 (參考瓶身標示，常見容量如 600cc、1,000cc、1,250cc 或 2,000cc 等，可視需要自行選擇運用)，用以計算漂白水或清水量。
4. 手套、口罩、防水圍裙及護目鏡。

#### (二) 消毒水泡製方式：(以市售家用漂白水次氯酸鈉濃度 5%計算)

1. 0.1% (1,000ppm) 泡製方式：【200cc 漂白水 + 10 公升清水中】

(免洗湯匙 10 瓢) (2,000cc 寶特瓶 5 瓶)

2.0.5% (5,000ppm) 泡製方式：【1,000cc 漂白水 + 10 公升清水中】